



EQUISTRO Flexadin UC II 600 g

Cena	1 179.00 zł
Dostępność	3 dni robocze
Czas wysyłki	3 dni robocze
Numer katalogowy	01006
Producent	EQUISTRO

Opis produktu

Połączenie MSMu, manganu oraz naturalnego kolagenu typu II.
Nowa, ulepszona formuła dla zwyrodnieniowych chorób stawów oraz dla koni w treningu.

Stawy są strukturami o skomplikowanej budowie i należy o nie odpowiednio dbać.

Przyjmując odpowiednią dawkę składników w postaci chrząstki stawowej, można osiągnąć skuteczne przemieszczanie się stykających się ze sobą kości w obrębie stawu.

Chrząstka łatwo ulega zniszczeniu, szczególnie w okresie intensywnego ruchu.

Konie aktywne, których stawy narażone są na uszkodzenia wskutek nadmiernego wysiłku lub po przebytej operacji ortopedycznej, znajdują się w grupie szczególnego ryzyka.

W momencie powstania mikrourazu dochodzi do zmian w obrębie chrząstki.

Jeżeli zwyrodnienie chrząstki nie zostanie powstrzymane, sytuacja ulega dalszemu pogorszeniu i dochodzi do zmian w obrębie kości.

Mangan w formie IPALIGO to opatentowana organiczna postać tego minerału o lepszej biodostępności.

Mangan stabilizuje strukturę kwasu hialuronowego zabezpieczając przed działaniem wolnych rodników.

Mangan bierze udział w syntezie siarczanu chondroityny

Kolagen typu II to kluczowy składnik chrząstki stawowej zbudowany z potrójnej helisy.

Rozpoznawalny przez system immunologiczny. Odporny na trawienie w żołądku.

Stosowanie

Equistro FLEXADIN UC II działa ochronnie na stawy koni w okresie wzmożonego wysiłku.

Reguluje, stabilizuje i wspomaga metabolizm stawów, ułatwia ich ruchomość.

Już w początkowym okresie stosowania widoczna jest zdecydowana poprawa.

Znacząco redukuje dolegliwości bólowe już w pierwszym miesiącu suplementacji.

Zawartość:

białko surowe 1%,

popiół surowy 7,3%,

wilgotność 6%,

popiół nierozpuszczalny w HCl 5,2 %

włókno surowe 0,4%,

sód 1 %

Skład

laktoza

MSM 39,6% chlorek potasu

kolagen typu II 0,8%

Zawartość składników w 1 miarce = 5 g:

chlorowodorek glukozaminy (99%) 1800 mg,

siarczan chondroityny (95%) 600 mg,

Harpagophytum procumbens 300 mg,

mangan (w formie Ipaligo) 480 mg

Dawkowanie

Konie o standardowej masie ciała 500 kg

Program początkowy - do 12 tygodni: 10 g dziennie lub do uzyskania wyraźniej poprawy

Kontynuacja leczenia: 10 g dziennie

Stosować wymieszany z paszą, w przypadku problemów z takim pobraniem można zmieszać z miodem lub melasą albo

podawać po wymieszaniu z wodą, bezpośrednio doustnie przy pomocy dozownika.

Nie stosować u przeżuwaczy.

Nie zawiera substancji uznawanych za doping.

Opakowanie

600 g z miarką (10 g)